

SANTÉ CANADA A ACCORDÉ UNE EXCEPTION TEMPORAIRE À L'IMPORTATION D'UNE QUANTITÉ LIMITÉE DE SUSPENSIONS D'IBUPROFÈNE ADVIL® POUR ENFANTS. SERVEZ-VOUS POUR AVOIR LA VERSION FRANÇAISE DE L'EMBALLAGE DE CES PRODUITS IMPORTÉS



Suspension Advil pour enfants Suspension orale d'ibuprofène 100 mg par 5 mL Analgésique / antipyrétique (AINS)

Liquide au goût de gomme à bulles destiné aux enfants de 2 à 11 ans.
120 mL (4 oz liq.)

Important : Lire tous les renseignements sur le produit avant d'utiliser. Conserver cette boîte car elle contient des renseignements importants. Ce produit est destiné aux enfants de 2 à 11 ans.

INFO-MÉDICAMENT

Ingrédient actif (par 5 mL)

Ibuprofène 100 mg (AINS)*

* anti-inflammatoire non stéroïdien

Utilité Antipyrétique / analgésique

USAGES

- abaisse temporairement la fièvre
- soulage temporairement les douleurs mineures associées au rhume et à la grippe, aux maux de gorge, aux maux de tête et aux maux de dents

MISES EN GARDE

Alerte aux allergies :

L'ibuprofène peut provoquer une grave réaction allergique, en particulier chez les personnes allergiques à l'aspirine.

Les symptômes peuvent comprendre :

- urticaire
- rougeurs
- enflure du visage
- éruptions cutanées
- asthme (respiration sifflante)
- cloques
- choc

En cas de réaction allergique, cesser l'utilisation du produit et consulter un médecin immédiatement.

Avertissement concernant les saignements gastriques : Ce produit

contient un AINS qui peut provoquer des saignements d'estomac graves. Ce risque est accru si l'enfant :

- a des antécédents d'ulcères gastriques ou de saignement
- prend des anticoagulants ou des stéroïdes
- prend d'autres médicaments contenant un AINS sur ordonnance ou en vente libre [aspirine, ibuprofène, naproxène ou autre]
- dépasse la dose ou la durée de traitement indiquée

Avertissement concernant les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux : Les AINS, à l'exception de l'aspirine, accroissent le risque de crise cardiaque, d'insuffisance cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, qui peuvent être mortels. Le risque peut augmenter si la dose ou la durée de traitement indiquée sont dépassées.

Avertissement concernant le mal de gorge : Un mal de gorge intense ou persistant, ou accompagné d'une forte fièvre, de maux de tête, de nausées et de vomissements peut être grave. Consulter un médecin sans tarder. Ne pas utiliser pendant plus de 2 jours ni administrer aux enfants de moins de 3 ans, sauf sur avis d'un médecin.

Ne pas utiliser

- si l'enfant a déjà eu une réaction allergique à un autre analgésique / antipyrétique

- immédiatement avant ou après une chirurgie cardiaque

Consulter un médecin avant l'utilisation si

- l'enfant présente un risque de saignement de l'estomac
- la prise d'analgésiques ou d'antipyrétiques entraîne des problèmes ou des effets secondaires graves chez l'enfant
- l'enfant a des antécédents de problèmes gastriques, par exemple des brûlures d'estomac
- l'enfant fait de l'hypertension ou a une maladie du cœur ou des reins, une cirrhose du foie ou de l'asthme, ou a déjà eu un accident vasculaire cérébral
- l'enfant a un apport en liquides insuffisant
- l'enfant a perdu une quantité importante de liquides des suites de vomissements ou d'une diarrhée
- l'enfant prend un diurétique

Consulter un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si l'enfant

- est suivi par un médecin en raison d'un trouble grave
- prend un autre médicament

Lors de l'utilisation de ce produit

- prendre avec des aliments ou du lait en cas de maux d'estomac

Cesser d'utiliser et consulter un médecin si

- l'enfant présente l'un ou l'autre des signes de saignement gastrique suivants :
 - sensation d'évanouissement
 - vomissement de sang
 - selles sanguinolentes ou noirâtres
 - douleurs à l'estomac qui ne s'améliorent pas
- l'enfant a des symptômes de problèmes cardiaques ou d'accident vasculaire cérébral :
 - douleur thoracique
 - difficulté à respirer
 - faiblesse d'une partie ou d'un côté du corps
 - troubles de l'élocution
 - enflure des jambes

- l'enfant ne montre aucun signe de soulagement durant le premier jour de traitement (24 heures)

- la fièvre ou la douleur s'aggrave ou persiste plus de 3 jours
- la région douloureuse est rouge ou enflée
- de nouveaux symptômes apparaissent

Garder hors de la portée des enfants. En cas de surdose, obtenir des soins médicaux ou appeler un centre antipoison immédiatement.

MODE D'EMPLOI

- Cette étiquette ne contient pas de mode d'emploi ni d'avertissements complets pour une utilisation par les adultes.**
- Ne pas dépasser la dose indiquée.**
- Bien agiter avant d'utiliser.**
- mL = millilitre**
- Consulter le tableau pour connaître la dose exacte. Si possible, déterminer la dose selon le poids, sinon, selon l'âge.
- Répéter la dose toutes les 6-8 heures, au besoin.
- Ne pas utiliser plus de 4 fois par jour.
- Mesurer seulement avec le gobelet doseur fourni. Le gobelet doseur doit être utilisé pour la suspension Advil pour enfants seulement. Ne pas l'utiliser avec d'autres produits. Les repères du gobelet doseur tiennent compte du produit qui reste dans le gobelet en raison de l'épaisseur de la suspension.

Tableau de posologie

Poids (lb)	Âge (ans)	Dose (mL)
Moins de 24 lb	Moins de 2 ans	Consulter un médecin
24-35 lb	2-3 ans	5 mL
36-47 lb	4-5 ans	7,5 mL
48-59 lb	6-8 ans	10 mL
60-71 lb	9-10 ans	12,5 mL
72-95 lb	11 ans	15 mL

AUTRES RENSEIGNEMENTS

- Chaque dose de 5 ml contient : 3 mg de sodium
- Une dose dure 6-8 heures
- Conserver entre 20 °C et 25 °C (68-77 °F)

Voir le numéro de lot et la date d'expiration sous la boîte

INGRÉDIENTS INACTIFS

acide citrique monohydraté, AD&C rouge no 40, arômes naturels et artificiels, benzoate de sodium, carboxyméthylcellulose sodique, cellulose microcristalline, eau purifiée, édétate disodique, glycérine, gomme xanthane, polysorbate 80, propylène glycol, saccharose, solution de sorbitol

Ne pas utiliser si l'anneau rupturable du bouchon est détaché ou manquant.

QUESTIONS OU COMMENTAIRES?

Composer sans frais 1 888-275-9938, ou consulter un pharmacien, un médecin ou un professionnel de la santé

Longue durée : Jusqu'à 8 heures de soulagement de la fièvre.

Pratique : L'effet durable réduit le nombre de doses quotidiennes nécessaires.

Sans alcool

Pour obtenir les renseignements les plus récents sur les produits, visiter www.Advil.com

Dist. par : GSK Soins de santé aux consommateurs, Warren, NJ 07059

©2022 GSK ou son concédant de licence

M. de c. détenues ou utilisées sous licence par GSK. Brevets : www.productpats.com