

Comprimés, caplets, gel caplets Advil



Mode d'emploi

Adultes et enfants de plus de 12 ans : Prendre 1 ou 2 comprimés, caplets ou gel caplets toutes les 4 heures, au besoin, sans dépasser 6 comprimés, caplets ou gel caplets par période de 24 heures, sauf sur l'avis d'un médecin. Les enfants de 12 ans et moins devraient prendre Advil pour enfants.

• Précaution

Garder hors de portée des enfants. Cet emballage contient suffisamment de médicament pour incommoder gravement un enfant.

Mise en garde

Les personnes prenant de l'acide acétylsalicylique (AAS) ou d'autres produits contenant de l'ibuprofène, ou qui sont allergiques à l'AAS, aux salicylates, aux anti-inflammatoires, ou à l'un des ingrédients de ce produit ne doivent pas l'utiliser. Les personnes souffrant d'ulcère gastroduodénal, d'hypertension, de troubles cardiaques, rénaux ou hépatiques, de toute autre maladie grave ou prenant d'autres médicaments, ainsi que les femmes enceintes ou qui allaitent, doivent consulter un médecin avant de prendre Advil. Consulter un médecin si la douleur ou la fièvre dure plus de 5 jours. Ne pas dépasser la dose recommandée, sauf sur l'avis d'un médecin.

Si des douleurs abdominales, des brûlures d'estomac, des nausées ou des vomissements, des ballonnements, de la diarrhée ou de la constipation, des tintements ou des bourdonnements dans les oreilles, des étourdissements, de la nervosité, de l'insomnie, des changements de la vision, une rétention aqueuse, des démangeaisons, des éruptions cutanées ou tout autre symptôme inexplicable se manifestent pendant la prise d'Advil, arrêter immédiatement de l'utiliser et consulter un médecin. En cas de surdose, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin, même en l'absence de symptômes.

Ingrédients non médicinaux (comprimés et caplets)

acide stéarique, amidon de maïs, amidon prégélatinisé, benzoate de sodium, cellulose microcristalline, cire de carnauba, cire d'abeille, croscarmellose sodique, dioxyde de silicium, dioxyde de titane, éthoxyéthanol, glaçage pharmaceutique, gomme laque, laurylsulfate de sodium, lécithine, monoglycérides acétylés, oxydes de fer, parabens, povidone, saccharose, siméthicone.

Ingrédients non médicinaux (gel caplets)

acide stéarique, amidon de maïs, amidon prégélatinisé, croscarmellose sodique, dioxyde de silicium, dioxyde de titane, gallate de propyle, gélatine, glycérine, hypromellose, jaune no 6 FD&C, laurylsulfate de sodium, oxydes de fer, propylène glycol, rouge no 40 FD&C, triacétine, triglycérides à chaîne moyenne.

Caplets Advil Extra-fort



Mode d'emploi

Adultes et enfants de plus de 12 ans : Prendre 1 caplet toutes les 4 heures, au besoin, sans dépasser 3 caplets par période de 24 heures, sauf sur l'avis d'un médecin. Les enfants de 12 ans et moins devraient prendre Advil pour enfants.

• Précaution

Garder hors de portée des enfants. Cet emballage contient suffisamment de médicament pour incommoder gravement un enfant.

Mise en garde

Les personnes prenant de l'acide acétylsalicylique (AAS) ou d'autres produits contenant de l'ibuprofène, ou qui sont allergiques à l'AAS, aux salicylates, aux anti-inflammatoires, ou à l'un des ingrédients de ce produit ne doivent pas l'utiliser. Les personnes souffrant d'ulcère gastroduodénal, d'hypertension, de troubles cardiaques, rénaux ou hépatiques, de toute autre maladie grave ou prenant d'autres médicaments, ainsi que les femmes enceintes ou qui allaitent, doivent consulter un médecin avant de prendre Advil. Consulter un médecin si la douleur ou la fièvre dure plus de 5 jours. Ne pas dépasser la dose recommandée, sauf sur l'avis d'un médecin.

Si des douleurs abdominales, des brûlures d'estomac, des nausées ou des vomissements, des ballonnements, de la diarrhée ou de la constipation, des tintements ou des bourdonnements dans les oreilles, des étourdissements, de la nervosité, de l'insomnie, des changements de la vision, une rétention aqueuse, des démangeaisons, des éruptions cutanées ou tout autre symptôme inexplicable se manifestent pendant la prise d'Advil, arrêter immédiatement de l'utiliser et consulter un médecin. En cas de surdose, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin, même en l'absence de symptômes.

Ingrédients non médicinaux

acide stéarique, amidon de maïs, amidon prégélatinisé, croscarmellose sodique, dioxyde de silicium, dioxyde de titane, gomme laque, hydroxypropylméthylcellulose, laurylsulfate de sodium, lécithine, oxydes de fer, polyéthylène glycol, siméthicone, talc.

Liqui-Gels® Advil et Liqui-Gels Advil Extra-fort



Mode d'emploi (Liqui-Gels Advil 200 mg)

Adultes et enfants de plus de 12 ans : Pour les migraines, prendre 1 ou 2 Liqui-Gels dès l'apparition des premiers symptômes, puis toutes les 4 heures, au besoin. Pour tout autre usage, prendre 1 ou 2 Liqui-Gels toutes les 4 heures, au besoin. Ne pas dépasser 6 Liqui-Gels par période de 24 heures, sauf sur l'avis d'un médecin. Les enfants de 12 ans et moins devraient prendre Advil pour enfants.

Mode d'emploi (Liqui-Gels Advil Extra-fort 400 mg)

Adultes et enfants de plus de 12 ans : Pour les migraines, prendre 1 Liqui-Gel dès l'apparition des premiers symptômes, puis toutes les 4 heures, au besoin. Pour tout autre usage, prendre 1 Liqui-Gel toutes les 4 heures, au besoin. Ne pas dépasser 3 Liqui-Gels par période de 24 heures, sauf sur l'avis d'un médecin. Les enfants de 12 ans et moins devraient prendre Advil pour enfants.

• Précaution

Garder hors de portée des enfants. Cet emballage contient suffisamment de médicament pour incommoder gravement un enfant.

Mise en garde

Les personnes prenant de l'acide acétylsalicylique (AAS) ou d'autres produits contenant de l'ibuprofène, ou qui sont allergiques à l'AAS, aux salicylates, aux médicaments anti-inflammatoires, ou à l'un des ingrédients de ce produit ne doivent pas l'utiliser. Les personnes souffrant d'ulcère gastroduodénal, d'hypertension, de troubles cardiaques, rénaux ou hépatiques, de toute autre maladie grave ou prenant d'autres médicaments, ainsi que les femmes enceintes ou qui allaitent, doivent consulter un médecin avant de prendre Advil. Consulter un médecin si la douleur ou la fièvre dure plus de 5 jours. Ne pas dépasser la dose recommandée, sauf sur l'avis d'un médecin.

Si des douleurs abdominales, des brûlures d'estomac, des nausées ou des vomissements, des ballonnements, de la diarrhée ou de la constipation, des tintements ou des bourdonnements dans les oreilles, des étourdissements, de la nervosité, de l'insomnie, des changements de la vision, une rétention aqueuse, des démangeaisons, des éruptions cutanées ou tout autre symptôme inexplicable se manifestent pendant la prise d'Advil, arrêter immédiatement de l'utiliser et consulter un médecin. En cas de surdose, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin, même en l'absence de symptômes.

Ingrédients non médicinaux (Liqui-Gel Advil 200 mg)

dioxyde de titane, eau purifiée, gélatine, hydroxyde de potassium, phthalate d'acétate de polyvinyle, polyéthylène glycol, propylène glycol, sorbitanne, sorbitol, vert FD&C no 3.

Ingrédients non médicinaux (Liqui-Gels Advil Extra-fort 400 mg)

eau purifiée, gélatine, hydroxyde de potassium, lécithine, oxyde de fer, phthalate d'acétate de polyvinyle, polyéthylène glycol, propylène glycol, sorbitanne, sorbitol, triglycérides à chaîne moyenne.